

ANAIS DO II CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES



ANAIS DO II CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES



SÍNDROME METABÓLICA E TRANSTORNO MENTAL: PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS METABÓLICOS EM PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA

Fernanda Gama de Barros¹, Ialy Beatriz Lima Ferreira¹, Sabryna Ribeiro Silva¹, Eugênio BarrosBortoluzi¹, Taís Regina Dias Gama Nunes²

¹Centro Universitário Unifacisa, ²Universidade Federal do Cariri

DOI: 10.47094/IICNNESP.2021/81

Introdução: Segundo o National Cholesterol Education Program (NCEP), a síndrome metabólica é definida pela presença de obesidade central, hipertrigliceridemia, baixos níveis de colesterol HDL, hipertensão arterial e hiperglicemia de jejum. A esquizofrenia é um transtorno psicótico que envolve disfunções cognitivas e emocionais. Nos últimos anos, essa doença mental vem sendo associada a distúrbios metabólicos que aumentam o risco cardiovascular. **Objetivo:** Analisar a relação e prevalência de síndrome metabólica em pacientes esquizofrênicos. **Metodologia:** De caráter bibliográfico, para o aprofundamento teórico-conceitual dos temas inerentes aos distúrbios metabólicos e transtornos mentais, por meio da base de dados da plataforma acadêmica Scielo, de conhecimento documental, para exploração de documentos e descritiva, visto que permite registrar e descrever os processos observados sem que o pesquisador interfira, e assim, estabelecendo relações entre as variáveis estudadas, bem como se enquadra como exploratória, uma vez que busca aprofundar-se no assunto e orienta a fixação dos objetivos. **Resultados:** Dos pacientes avaliados no estudo transversal, a grande maioria apresenta síndrome metabólica. Dessa estimativa, destaca-se a presença de hipertensão arterial sistêmica, circunferência abdominal elevada, hiperglicemia e hipertrigliceridemia nos pacientes. Os pacientes com excesso de peso e que fazem uso de antipsicóticos de segunda geração possuem mais chances de desenvolver síndrome metabólica quando comparado ao restante dos pacientes. **Conclusões:** Os pacientes esquizofrênicos apresentaram uma maior prevalência de síndromes metabólicas do que a população em geral. Assim, torna-se extremamente necessário a inclusão de medidas de prevenção e tratamento dos distúrbios do metabolismo e das doenças crônicas nessa população psiquiátrica, além da intervenção terapêutica para redução dos sintomas psicóticos.

Palavras-chave: Metabolismo. Psicose. Hipertensão.

Área Temática: Saúde física e Mental.

editoraomnisscientia@gmail.com 

<https://editoraomnisscientia.com.br/> 

@editora_omnis_scientia 

<https://www.facebook.com/omnis.scientia.9> 

+55 (87) 9656-3565 

editoraomnisscientia@gmail.com 

<https://editoraomnisscientia.com.br/> 

@editora_omnis_scientia 

<https://www.facebook.com/omnis.scientia.9> 

+55 (87) 9656-3565 