

ANAIS DO II CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES



ANAIS DO II CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES



TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DA DOENÇA DE MÉNÉTRIER: REVISÃO DE LITERATURA

Jorge Rubens de Sá Marcolino¹, Murilo Silva Nascimento¹, Afonso Miranda Luz Neto¹, Ulisses Monteiro da Costa Neto¹, Eduardo Andrade Lima da Cunha Pedrosa¹, Maria Natividade de Sá Antunes², Juliana Sá Marcolino³, Bruno Rodrigo de Sá Marcolino⁴, Stella Inácio Bezerra de Carvalho⁵, Alírio Caribé Ribeiro Neto⁶

¹Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ²Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada, ³Faculdade de Ciências Humanas ESUDA, ⁴Universidade Federal de Pernambuco, ⁵Universidade Federal do Vale do São Francisco, ⁶Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

DOI: 10.47094/IICNNESP.2021/181

Introdução: A Doença de Ménétrier é uma gastroenteropatia com hiperplasia epitelial, hipertrofia mucosa e perda da albumina, além de ser considerada como um fator de risco para neoplasia gástrica. O quadro clínico na infância geralmente possui uma duração autolimitada, enquanto que nos adultos há um maior risco de prognóstico reservado. O tratamento é direcionado para a causa base e o quadro clínico. Uma das medidas abordadas no tratamento é a dieta hiperproteica com baixo teor de gorduras devido à hipoalbuminemia. **Objetivos:** Construir uma revisão integrativa de literatura, analisando as terapêuticas empregadas para o tratamento da Doença de Ménétrier, com base em análise de artigos científicos sobre o tema. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados MEDLINE e SciELO com os descritores “gastrectomia”, “gastroenteropatia” e “terapêutica”, entre os anos de 2018 e 2021, em língua portuguesa e inglesa. **Resultados:** No que se refere ao tratamento medicamentoso, uma opção utilizada era a Ranitidina, mas houve a sua suspensão, em 2020, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por conter níveis elevados de N-nitrosodimetilamina (NDMA), que pode aumentar a predisposição às neoplasias. No que tange às classes utilizadas, o inibidor da bomba de prótons (Omeprazol) e o análogo da somatostatina (Octreotida) auxiliam na redução da secreção gástrica e da perda proteica. Nos casos de citomegalovirose, o Ganciclovir é uma opção, principalmente se o curso da doença tiver uma duração prolongada. Ademais, o tratamento cirúrgico diz respeito à gastrectomia (subtotal ou total), que pode ter a sua utilização em casos mais graves e com pior prognóstico. **Considerações Finais:** A Doença de Ménétrier necessita de maiores estudos sobre outras terapias que possam ser eficazes, proporcionando melhoria no seu prognóstico.

Palavras-Chave: Gastrectomia. Gastroenteropatia. Terapêutica.

Área Temática: Outras.

editoraomnisscientia@gmail.com 

<https://editoraomnisscientia.com.br/> 

@editora_omnis_scientia 

<https://www.facebook.com/omnis.scientia.9> 

+55 (87) 9656-3565 

editoraomnisscientia@gmail.com 

<https://editoraomnisscientia.com.br/> 

@editora_omnis_scientia 

<https://www.facebook.com/omnis.scientia.9> 

+55 (87) 9656-3565 